

TRUCOS Y ARTIMAÑAS

PRIMEROS AUXILIOS DENTALES

Dolor de Muelas/Dientes




- * Limpie el área alrededor del diente completamente.
- * Aclare la boca con cera dental o agua tibia salada para sacar alimentos atorados.
- * NO coloque aspirina en la encía ni en el diente que le duele.
- * Los niños deben tomar Tylenol o Motrin para el dolor en vez de aspirina.
- * Vea a su dentista lo mas pronto posible.



Lengua Partida o Cortada, Labio, Mejilla



- * Aplique hielo en el área adolorida.
- * Si allí sangra, aplica presión firme pero suave con gasa o tela limpia.
- * Si la sangre no para después de 15 minutos ni puede ser controlada por la simple presión vaya a la sala de urgencias más cercana.



Diente Permanente Caído



- * Busque el diente, y tómelo de arriba, NO de la raíz.
- * Está bien enjuagar el diente, pero NO limpiar ni tomar el diente si no es necesario.
- * Trate de reinsertar el diente en su lugar.
- * Ponga al niño que detenga el diente en su lugar mordiendo la gasa o tela.
- * Si no puede ser reinsertado, transpórtelo en un contenedor de leche.
- * Vea a un dentista INMEDIATAMENTE.
- * Los dientes permanentes pueden ser rescatados.
- * NO trate de reinsertar los dientes de bebe.



Diente Roto




- * Enjuague la tierra de las áreas heridas con agua tibia.
- * Coloque compresa fría sobre la cara en el área de la herida.
- * Sitúe y salve fragmentos rotos de diente.
- * Vea a un dentista INMEDIATAMENTE.



Sangrar Después que un Diente de Leche se Cae



- * Doble una gasa limpia o tela sobre el área sangrienta.
- * Que el niño muerda la gasa con la presión durante 15 minutos.
- * Esto puede necesitar ser repetido una vez, si la sangre persiste, vea a un dentista.



Llagas de Frío



- * Muchos niños sufren ocasionalmente de llagas de frío que pueden durar hasta dos semanas.
- * Generalmente los productos de la tienda ayudan.
- * Vea a un dentista si las llagas persisten.

