







PRIMEROS AUXILIOS



Problemas Dentales Para Niños De Cero A Tres Años

Siga las instrucciones a continuación cuando su hijo tenga un problema dental.

En todos los casos, tranquilice a su hijo con palabras silenciosas y un tacto suave.

<p>DOLOR DE MUELAS</p> 	<p>Limpie el área alrededor del diente. Use hilo dental para remover la comida atrapada. Revise si el diente dolorido tiene las manchas marrones o descarapelado en el diente. Siga las instrucciones de su médico cuando le dé el analgésico de venta libre o mostrador, como Tylenol para niños (acetaminofeno) o Motrin para niños (ibuprofeno). NO coloque la aspirina sobre la encía o el diente dolorido. Si el diente está roto, tiene manchas en ella o si continúa el dolor, consulte a un dentista.</p>
<p>CORTADA O MORDIDA EN LA LENGUA, LABIO O CACHETE</p> 	<p>Aplicar hielo en las zonas magulladas. Si hay sangrado, aplique presión firme, suave con un paño limpio. Si el sangrado no se detiene después de 15 minutos o que no pueden ser controlados por simple presión, llame a su médico o dentista para obtener asesoramiento.</p>
<p>DIENTE ROTO</p> 	<p>Enjuague la suciedad de la boca con agua tibia. Coloque un paño frío sobre el área de la lesión. Llame al consultorio dental para ver si es necesario que el dentista vea a su hijo de inmediato.</p>
<p>SANGRADO DESPUÉS QUE EL DIENTE DE LECHE SE CAE</p> 	<p>Doble un paquete de tela limpia sobre el área de sangrado. Haga que el niño muerda durante 15 minutos. Repetir una vez más si sigue sangrando. Si el sangrado no se detiene, ver a un dentista. Si el diente de leche se cae, NO lo ponga de nuevo ya que esto podría dañar el diente adulto que se está formando bajo las encías.</p>
<p>EL HERPES LABIAL / ÚLCERAS BUCALES</p> 	<p>Muchos niños sufren a veces de “frío” o “llagas bucales”. Por lo general puede encontrar sobre-el-mostrador medicamento de ayuda. Si estas úlceras duran más de 2 semanas, lleve a su hijo al dentista.</p>
<p>MANDÍBULA HINCHADA</p> 	<p>La hinchazón puede ser grave. Consulte a un dentista tan pronto como sea posible. Siga las instrucciones de su médico cuando le dé el analgésico de venta libre o mostrador, como Tylenol para niños (acetaminofeno) o Motrin para niños (ibuprofeno).</p>